

06-30-00

A

EXPRESS MAIL NO. EL593673717U

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

Application of Uwe Karsten, Franz-Georg Hanisch, Hans Paulsen

ATTORNEY USER NO.:

Filed on June 29, 2000

For TUMOR VACCINES FOR MUCI-POSITIVE CARCINOMAS

Attorney's Docket 0107-027P



23622

PATENT TRADEMARK OFFICE

06/29/00
841 U.S. PTO

Jc714 U.S. PTO
09/606910
06/29/00

Box New Patent Application - No Fee
Hon. Commissioner of Patents and Trademarks
Washington DC 20231

Sir:

NEW PATENT APPLICATION

Enclosed herewith for filing is a 6 page application (in German) comprised of specification, 7 claims, an abstract, and 2 sheets of drawing.

The priority of German Patent Application No.197 58 400.4, filed on December 30, 1997, is hereby claimed, the contents of which are incorporated herein by reference thereto. A certified copy will be filed in due course.

The filing fee and all other documents, including the English translation, will be filed later.

GABRIEL P. KATONA L.L.P.
708 Third Avenue, 14th Floor
New York, New York 10017

(212) 370-4000 Phone
(212) 370-7336 Fax

Respectfully submitted,

Gabriel P. Katona
Attorney for Applicant
Registration No. 20,829

0950540 062900

WO 99/34824

1

PCT/DE98/03819

Tumorstoffe für MUC1-positive Karzinome

Beschreibung

Die Erfindung betrifft neuartige Tumorstoffe auf der Grundlage der Molekülstruktur des menschlichen epithelialen Muzins (MUC1). Anwendungsgebiet der Erfindung ist die Immuntherapie von Karzinomen.

Epitheliale Muzine sind Glykoproteine mit repetitiven Aminosäuresequenzen und einem hohen Kohlenhydratanteil, die teils membrangebunden sind, teils sezerniert werden und auf vielen Drüsenepithelien vorkommen. Das am besten bekannte epitheliale Muzin ist das membrangebundene MUC1, auch als PEM, PUM, EMA, MAM-6, PAS-O oder Episialin beschrieben (Finn, O., et al., Immunol.Reviews 145:61, 1995), dessen extrazellulärer Teil aus einer variablen Anzahl sich wiederholender Einheiten aus 20 Aminosäuren besteht, den sogenannten "Tandem-Repeats". Das MUC1 ist an sich kein tumorspezifisches Molekül; seine Eignung als Tumorstoffe beruht darauf, daß sein Kohlenhydratanteil bei Tumoren qualitativ und quantitativ verändert ist (Burchell, J., und Taylor-Papadimitriou, J., Epith.Cell Biol. 2:155, 1993). Dabei treten neue Epitope auf, die vom Immunsystem (humorale und zelluläre Abwehr) wahrgenommen werden.

Nach operativer Entfernung des Primärtumors (bzw. nach Strahlen- oder Chemotherapie) muß in der Regel davon ausgegangen werden, daß noch Tumorzellen im Körper verbleiben ("minimal residual disease"). Diese Tumorzellen, die eine potentielle Gefahr darstellen, werden durch verschiedene körpereigene Mechanismen bekämpft, deren Wirksamkeit durch eine adjuvante Immuntherapie verstärkt werden kann. Die effektivste adjuvante Immuntherapie ist die Vakzinierung. Zwei Voraussetzungen sind hierfür erforderlich: erstens, daß ein geeignetes Zielantigen (Epitop) auf den Tumorzellen vorhanden ist, und zweitens, daß es gelingt, eine möglichst stark immunogene, vorzugsweise synthetische Form einer Vakzine herzustellen.

WO 99/34824

2

PCT/DE98/03819

Nicht-glykosylierte Oligo-Repeat-Peptide des MUC1 stellen ein geeignetes Zielantigen bei einer Reihe häufiger Karzinome dar (Apostolopoulos, V., und McKenzie, I.F.C., Crit.Rev.Immunol. 14:293, 1994). Die immundominante Region des MUC1 ist das Motiv PDTRPAP, das auf jedem Tandem-Repeat vorhanden ist. Bisherige Versuche, eine Vakzine auf der Basis eines einzelnen Tandem-Repeats zu entwickeln, waren jedoch nicht erfolgreich. Nach dem bisherigen Stand des Wissens ist für das Zustandekommen der immunogenen Konformation des Peptids eine Mindestlänge des Peptids erforderlich, die erst bei 3-5 Tandem-Repeats erreicht wird (Fontenot, J.D., et al., J.Biomol.Struct.Dyn. 13:245, 1995).

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, auf der Basis der Molekülstruktur des menschlichen epithelialen Mucins MUC1 eine Tumorzelle zu entwickeln, die insbesondere zur Bekämpfung von nach anderen Therapien im Körper noch verbliebenen Tumorzellen geeignet ist.

Bei der immunologischen Untersuchung synthetischer Glykopeptide, die einem Tandem-Repeat des MUC1 entsprechen, wurde überraschend gefunden, daß die Glykosylierung des Threonins innerhalb der immundominanten Region PDTRPAP mit α -GalNAC die Antigenität signifikant erhöht. Bisher war davon ausgegangen worden, daß diese Position bei nativem MUC1 nicht glykosyliert ist. Zu dieser Schlußfolgerung hatten die Annahme, daß eine Glykosylierung die Erkennung von Peptidepitopen in der Regel behindert, sowie Ergebnisse von *in-vitro*-Glykosylierungsversuchen (Stadie, T., et al., Eur.J.Biochem. 229: 140(1995)) geführt. Neueste Untersuchungen (Müller, S., et al., J.Biol.Chem. 272:24780, 1997) zeigen allerdings, daß das Threonin im PDTRPAP-Motiv *in vivo* sehr wohl glykosyliert sein kann. Aus den genannten neuen Ergebnissen wird geschlossen, daß die Antigenität (und im Zusammenhang damit auch die Immunogenität) des MUC1-Tandem-Repeats durch Glykosylierung des Thr im PDTRPAP-Motiv mittels GalNAC oder einem kurzen Oligosaccharid erheblich erhöht wird. Dadurch wird die immunogene Konformation der immundominanten Region bereits von

einem einzelnen Tandem-Repeat erreicht. Die Antigenität des glykosylierten PDTRPAP-Motivs in einem Monorepeat übertrifft sogar die des oligomeren, nicht glykosylierten Peptids.

Auf der Basis dieser Entdeckung wird vorgeschlagen, Tumorstoffe verschiedener Molekülgrößen zu entwickeln, die am Thr des PDTRPAP-Motivs durch GalNAc oder ein geeignetes kurzkettiges Oligosaccharid glykosyliert sind. Die Aufgabe der Erfindung wird gemäß Anspruch 1 gelöst, die Unteransprüche sind Vorzugsvarianten.

Die Erfindung soll nachstehend durch ein Ausführungsbeispiel näher erläutert werden.

Beispiel 1

Antigenität von synthetischen MUC1-abgeleiteten Glykopeptiden

Im folgenden wird die Bindung von monoklonalen Antikörpern gegen das immundominante Motiv PDTRPAP des epithelialen Muzins (MUC1) an synthetische Glykopeptide dieses Muzins mit einer Länge von 20 bzw. 21 Aminosäuren in einem Festphasen-Immunoassay (ELISA) untersucht. Die Glykopeptide mit den Bezeichnungen A1 bis A12 sind in Tabelle 1 aufgeführt. Sie entsprechen einem überlappenden Tandem-Repeat des MUC1 und enthalten 5 potentielle Glykosylierungsstellen (3x Thr, 2x Ser); A1-A9 enthalten ein zusätzliches Ala. Die Glykopeptide unterscheiden sich in der Zahl und Position der Glykosylierungsstellen (siehe Tabelle 1). A1-A9 tragen als Glykane das Thomsen-Friedenreich-Antigen (TF) B-D-Gal(1-3)α-D-GalNAc-O-R, während A11 und A12 lediglich α-D-GalNAc-O-R (das Tn-Antigen) tragen. Die benutzten Antikörper sind: A76-A/C7 (Maus, IgG1, Epitop: APDTRPAP) und MF06 (Maus, IgG1, Epitop DTRPAP) (siehe: Rye, P.D., Price, M.R., eds., ISOBM TD-4 International Workshop on Monoclonal Antibodies against MUC1, Tumor Biol. 19, Suppl.1, 1998).

WO 99/34824

4

PCT/DE98/03819

Tabelle 1: Synthetische Glykopeptide; das Peptid entspricht der Grundstruktur des epithelialen Muzins (MUC1). Die immundominante Region ist unterstrichen.

A: Glykosylierung mit TF:

A--H--G--V--T--S--A--P--D--T--R--P--A--P--G--S--T--A--P--P--A
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Peptid # Glykosyliert in Position:

A1	5
A2	10
A3	17
A4	6
A5	16
A6	5, 17
A7	5, 16, 17
A8	5, 6, 16, 17
A9	5, 6, 10, 16, 17

B: Glykosylierung mit Tn:

H--G--V--T--S--A--P--D--T--R--P--A--P--G--S--T--A--P--P--A
 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Peptid # Glykosyliert in Position:

A11	5, 17
A12	5, 6, 10, 16, 17

WO 99/34824

6

PCT/DE98/03819

Patentansprüche

1. Tumorstoffe, enthaltend vom menschlichen epithelialen Mucin MUC1 abgeleitete synthetische Peptide unterschiedlicher Länge, die am Threonin der enthaltenen immundominanten Regionen PDTRPAP glykosyliert sind.

2. Tumorstoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die synthetischen Peptide eine Länge von > 20, vorzugsweise von 40-120 Aminosäuren, haben.

3. Tumorstoffe nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß die Glykosylierung durch Monosaccharide erfolgt.

4. Tumorstoffe nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Glykosylierung durch α N-Acetylgalactosamin (GalNAc) erfolgt.

5. Tumorstoffe nach Anspruch 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Glykosylierung durch kurzkettige Oligosaccharide erfolgt.

6. Tumorstoffe nach Anspruch 1 bis 3 und 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Glykosylierung durch das Disaccharid Gal β -1,3-GalNAc α erfolgt.

7. Verwendung der Tumorstoffe nach Anspruch 1 bis 6 zur Bekämpfung von Tumorzellen aus Mamma-, colorectalen oder Pankreas-karzinomen im Sinne einer aktiven spezifischen Immunisierung.

Bindung des anti-MUC1-Antikörpers A76-A/C7 an die Glykopeptide A1-A9 und A11-A12.




Abb.1:

Bindung des anti-MUC1-Antikörpers MF06 an die Glykopeptide A1-A9 und A11-A12.




Abb. 2: